

PRZYGOTOWANIE DO BADANIA KOLONOSKOPII

7 DNI PRZED BADANIEM NIE NALEŻY SPOŻYWAĆ:

- * pieczywa z ziarnami
- * produktów wzdymających np. kapusty, fasoli itp.
- * produktów zawierających drobne ziarna, pestki np. pomidory, ogórki, słonecznik, sezam, siemię lniane, owsianki, otręby, kiwi, winogrona itp.
- * buraczków
- * soków o czerwonym lub ciemnym zabarwieniu

PRZED BADANIEM NALEŻY ODSZTAWIĆ LEKI ROZRZEDZAJĄCE KREW:

- * **7 dni przed badaniem** : ACARD, VARFIN, POLOCARD, ACENOCUMAROL
- * **3 dni przed badaniem** : XARELTO, PRADAXA, ELIQUIS
- * **7 DNI PRZED BADANIEM NALEŻY ODSZTAWIĆ PREPARATY ZAWIERAJĄCE ŻELAZO**

W przeddzień badania można zjeść lekkie śniadanie, do 15:00 zjeść kisiel, pić bulion.

W czasie przygotowywania się do badania można pić wodę niegazowaną, herbatę, soki klarowne np. jabłkowy, winogronowy.

W DNIU BADANIA NIE WOLNO NIC JEŚĆ!!!

3 GODZINY PRZED BADANIEM ZAKOŃCZYĆ PICIE PŁYNÓW

PRZYGOTOWANIE DO KOLONOSKOPII PREPARATEM PRZECZYSZCZAJĄCYM

(ZALECANE ŚRODKI : MOVIPREP, EZICLEN, FORTTRANS)

Środek przeczyszczający stosujemy według załączonej ulotki.

NASTĘPNIE NALEŻY WYPIĆ 1,5L WODY – CO 15 MINUT 1 SZKLANKA.

W TRAKCIE PICIA PREPARATU I WODY ZALECA SIĘ ZWIĘKSZONĄ ILOŚĆ RUCHU.

Jeżeli badanie jest w godzinach porannych tj. 7:00 – 9:00

Pierwszą dawkę preparatu należy spożyć (według instrukcji) w przeddzień badania zaczynając od godziny 15:00

Drugą dawkę preparatu należy spożyć (według instrukcji) zaczynając w przeddzień badania od godziny 21:00

W przeddzień badania pacjent może rano zjeść lekkie śniadanie lub kisiel. Należy pić wodę niegazowaną, herbatę. W dniu badania nie należy nic pić.

Jeżeli badanie jest w godzinach 10:45 – 12:30

Pierwszą dawkę preparatu należy spożyć (według instrukcji) w przeddzień badania zaczynając od godziny 18:00

Drugą dawkę preparatu należy spożyć (według instrukcji) w dniu badania zaczynając od godziny 5:00

Picie wody niegazowanej należy zakończyć 3 godziny przed badaniem, jeśli wykonywana jest również gastroskopia picie wody należy zakończyć 4 godziny przed badaniem.

Jeżeli badanie jest wykonywane w godzinach 14:00 – 20:00

Pierwszą dawkę preparatu należy spożyć (według instrukcji) w przeddzień badania zaczynając od godziny 18:00. Można też spożyć pierwszą dawkę w dniu badania o godz. 5:00 / 6:00 rano.

Drugą dawkę preparatu należy spożyć (według instrukcji) 6 godzin przed planowaną godziną badania.

Picie płynów należy zakończyć 3 godziny przed badaniem.

UWAGA!

PACJENCI ZAŻYWAJĄCY LEKI NA STAŁE POWINNI JE PRZYJAĆ ZGODNIE Z ZALECENIAMI. WYJĄTKIEM SĄ LEKI ROZRZEDZAJĄCE KREW (informacja powyżej) ORAZ LEKI NA CUKRZYCĘ (nie zażywa się takich leków bez jedzenia).

W razie pytań należy skontaktować się z lekarzem rodzinnym lub lekarzem kierującym na badanie.

!!! PACJENCI Z PLANOWANYMI BADANIAMI ZE ZNIECZULENIEM OGÓLNYM LUB ANALGOSEDACJĄ NA BADANIE ZGŁASZAJĄ SIĘ Z OSOBĄ TOWARZYSZĄCĄ.

!!! PO ZNIECZULENIU OGÓLNYM ORAZ SEDACJI NIE NALEŻY PROWADZIĆ SAMOCHODU PRZEZ 24 GODZINY.

!!! ZA RZECZY OSOBISTE POZOSTAWIONE W PRACOWNI ENDOSKOPOWEJ PERSONEL NIE ODPOWIADA.